

## Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF

- ⤴ wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42°C. - brak poprawy przy leczeniu antybiotykami;
- ⤴ UWAGA! gorączkujące świnie mogą mieć zachowany apetyt;
- ⤴ sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała
- ⤴ wybroczyny w skórze;
- ⤴ duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa;
- ⤴ zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego;
- ⤴ biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- ⤴ zwiększone upadki.



### Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

- niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii - do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
- nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;
- zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego -zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.